



Aviar
LABORATORIOS

Santos Dumont 4345 - (1427) Buenos Aires
Tel.: 4855-6374 / 4854-5523 - Fax: 4854-0282
E-mail: aviar1@laboratoriosaviar.com.ar

CEFAPLUS LA

Composición

Fórmula

Ceftiofur ácido libre 100 mg

Excipientes c.s.p. 1ml.

Indicaciones

CEFAPLUS L.A es un antibiótico bactericida formulado con una cefalosporina de tercera generación, altamente eficaz contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo a aquellas productoras de B-Lactamasas. CEFAPLUS L.A está indicado para el tratamiento de las Enfermedades bacterianas, respiratorias y sistémicas, Neumonías, Fiebre de Embarque, Pietín y para la prevención de Metritis.

Los agentes etiológicos susceptibles son:

Gram-positivos: *Bacillus* spp, *Fusobacterium necrophorum*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus suis*

Gram-Negativos: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Bacteroides melaninogenicus*, *Citrobacter*, *Enterobacter*, *Haemophilus parasuis*, *Haemophilus somnus*, *Klebsiella*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Porphyromonas asaccharolytica*, *Proteus* spp, *Salmonella choleraesuis*, *Salmonella typhimurium*

Especies de destino.

Bovinos y Porcinos.

Administración y dosis

CEFAPLUS L.A se debe administrar en porcinos por vía intramuscular en la tabla del cuello, detrás de la oreja y en bovinos, por vía subcutánea en la base de la oreja.

Bovinos: 6,6 mg por kg, corresponde a 1 ml cada 15 kg de peso vivo. Porcinos: 5 mg por kg, corresponde a 1 ml cada 20 kg de peso vivo.

Precauciones

Animales con antecedentes de hipersensibilidad o alergia a cefalosporinas. No se recomienda el uso de este producto en animales con insuficiencia renal o hepática. No está recomendada la aplicación del cefalosporinas conjuntamente con aminoglucósidos por riesgo de nefrotoxicidad. Agitar lentamente antes de usar. No mezclar con otros medicamentos en la misma jeringa. No aplicar en por vía endovenosa. En ciertos casos, luego de la aplicación del producto se podrá notar un pequeño bulto al retirar la jeringa, que al masajear suavemente desaparecerá. La aplicación en bovinos no deberá superar los 20 ml por punto de aplicación. La aplicación en porcinos no deberá superar los 4 ml por punto de aplicación. Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños. Aplicar con material limpio y seco siguiendo procedimientos asépticos. Este medicamento debe ser usado por un Médico veterinario. El laboratorio no se responsabiliza por el uso indebido y/o mala conservación del producto.

Almacenamiento

Como todo medicamento no se debe almacenar cerca de los alimentos o utensilios de cocina. No remover al producto de su recipiente original, depositarlo en lugar seco, al abrigo de la luz y temperatura entre 5 y 25° centígrados. Mantener fuera del alcance de los niños.

Periodo de retiro

En ambas especies deben transcurrir 14 días entre el último tratamiento y el sacrificio del animal para consumo humano. No administrar en bovinos en producción de leche.

Presentación

Frasco ampolla por 50 ml y 100 ml.