



Aviar
LABORATORIOS

Santos Dumont 4345 - (1427) Buenos Aires
Tel.: 4855-6374 / 4854-5523 - Fax: 4854-0282
E-mail: aviar1@laboratoriosaviar.com.ar

TILOPLUS DUO

Composición

Fórmula

Cada 100 ml contiene:

Tilmicosina (como fosfato)	30 g
Flunixinina (como megluminato)	3,7 g
Excipientes c.s.p	100 ml

Indicaciones

Tratamiento de la enfermedad respiratoria en bovinos asociada a *Pasteurella haemolitica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Mycoplasma dispar*, *Mycoplasma bovoculi*, *Mycoplasma bovirhinis*, *Pododermatitis necrótica* (pietín), *Queratoconjuntivitis* y del síndrome febril asociado a dichos procesos (acción antipirética, antiinflamatoria y analgésica de la flunixinina)

Especies de destino.

Bovinos

Administración y dosis

El producto debe ser utilizado únicamente en bovinos por vía subcutánea a la dosis de 1 ml por cada 30 kgpv. Una sola aplicación es suficiente salvo indicación del médico veterinario. No administrar más de 25 ml por punto de aplicación. Para el tratamiento de la Queraconjuntivitis infecciosa o de la Pododermatitis Necrotica (Pietín) administrar una única inyección subcutánea de 5 a 10 mg/ kg de peso corporal (1 ml cada 30 a 60 kg de peso).

Periodo de Retiro

No destinar la carne de los animales tratados a consumo humano hasta 28 días luego de finalizado el tratamiento. No utilizar en bovinos destinados a la producción de leche.

Precauciones

El producto debe ser utilizado únicamente en bovinos. No administrar por vía endovenosa. No administrar en porcinos ni equinos. No administrar en bovinos destinados a la producción de leche.

Almacenamiento

Conservar entre 15 y 25 °C.

Presentación

Frasco ampolla por 10 y 100 ml.