



Aviar
LABORATORIOS

Santos Dumont 4345 - (1427) Buenos Aires
Tel.: 4855-6374 / 4854-5523 - Fax: 4854-0282
E-mail: aviar1@laboratoriosaviar.com.ar

PHARMASIN 200

Composición

Fórmula

Cada 100 ml contiene:

Tilosina Tartrato (equivalente base)	20g
Excipientes c.s.p.	100ml

Indicaciones

Bovinos: Pietin, Endometritis, Neumonía, abscesos por Estafilococcus y otros procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a la Tilosina.

Porcinos: Infecciones causadas por Micoplasmas, Erisipela, Neumonía por Pasteurela.

Especies de destino

Bovinos, Porcinos, Caninos y Felinos.

Administración y dosis

Bovinos, Porcinos, Caninos y Felinos 0.4 a 1 mL/20kgpv IM cada 24 horas.

Precauciones

No administrar más de 10 ml por punto de aplicación en bovinos y 5 ml por punto de aplicación en porcinos. Puede presentarse reacciones de hipersensibilidad en animales susceptibles. En porcinos se han descrito casos de edema, prolapso rectal, diarrea y prurito anal. En caninos, luego de la administración en forma diaria reiterada de 5 mg/kg de peso, se ha descrito una tendencia mayor a desarrollar taquicardia y fibrilación ventricular. No administrar en equinos, se han descrito casos de intolerancia intestinal luego de la ingestión de macrólidos en general que pueden ser fatales.

Periodo de retiro

El periodo de restricción de faena es de 14 días para porcinos y 21 días para bovinos. No administrar en vacas lecheras en producción.

Almacenamiento

Conservar entre 4 y 25 °C, al abrigo de la luz.

Presentación

Frasco por 250 mL.